2018.10.25

질병관리본부
KCDC

우리아이가 조심해야 할

수두·유행성이하선염 어떻게 대비해야 할까요?

2018.10.25

질병관리본부
KCDC

수두와 유행성이하선염의 증상은?

수두

잠복기는 10~21일(평균 14~16일)이며,
발진 발생 1~2일 전 권태감과 미열이 나타난 뒤 발진 발생
(소아의 경우 발진이 첫 번째 증상으로 나타나기도 함)

증상이 가볍고 자가 치유되는 질환이나
간혹합병증(2차피부감염 , 폐렴, 신경계 질환)을 동반

유행성이하선염

14~18일의 잠복기를 거친 후에
발열, 두통, 근육통, 식욕부진, 구토 등의 증상이 1~2일간 발생

주요 증상은 침샘이 붓고 통증이 느껴지는 이하선염으로
감염된 사람의 약 30~40%에서 나타나기 때문에 증상이 없거나
호흡기 증상만을 나타내기도 함
간혹 합병증(신경계 질환, 고환염, 췌장염, 청력장애 등)을 동반

2018.10.25

질병관리본부
KCDC

수두와 유행성이하선염의 대비 방법 예방접종 EASY!

우리 아이, 표준 예방접종일정 준수 및 빠뜨린 접종 완료로 사전 대비 합니다.

(만12세 이하 어린이, 보건소와 지정 의료기관에서 무료접종 가능)

2018.10.25

질병관리본부
KCDC

의료기관에서는 의심환자 진단 시 전파 예방교육 실시 및 관할 보건소에 신고!

2018.10.25

질병관리본부
KCDC

보육시설과 학교에서는 단체 예방수칙 실천 및 감염 환자 등원·등교 중지!

수두 평균 10~21일까지, 모든 피부 병변에 딱지가 앉을 때 까지 격리

유행성이하선염 평균 14일~18일까지 (최장 25일), 증상 발현 후 5일 이후 등원 • 등교

2018.10.25

질병관리본부
KCDC

확산 방지를 위한 개인위생 실천과 단체생활 예방수칙!

예방수칙 01

비누를 사용하여 30초 이상 손을 자주 씻고,
기침이나 재채기를 할 때는 손이 아닌 휴지나 옷소매로
입과 코를 가리는 기침예절을 지켜 주세요

예방수칙 02

감염병 의심증상이 발생한 경우
다른 사람과 접촉하지 않고
곧바로 가까운 의료기관에서 진료를 받으십시오.

예방수칙 03

집단유행을 막기 위해 감염 환자는 전염기간 동안에는
등원 등교(학원 등 사람이 많은 장소 포함)를
하지 않도록 하세요.

2018.10.25

질병관리본부
KCDC

어린이가 건강한 대한민국

수두·유행성이하선염 함께 대비해요!